



<p>R^x Ramipril Tablets IP RAMITOP 5 रामीटॉप 5 Tablets</p> <p>10 x 10 Tablets</p>		
Each uncoated tablet contains: Ramipril IP 5 mg	SCHEDULE H PRESCRIPTION DRUG - CAUTION Not to be sold by retail without the prescription of a Registered Medical Practitioner.	
Dosage : As directed by the Physician.		
Storage : Store protected from light & moisture, at a temperature not exceeding 30°C.	Keep all medicines out of reach of children.	

ब्रांड नाम: RAMITOP 5MG TAB

सक्रिय संघटक: रामिप्रिल 5mg

सामान्य जानकारी:

RAMITOP 5MG TAB में रामिप्रिल होता है, जो एक **ACE इनहिबिटर** है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन), हृदय विफलता (हृदय की कमजोरी) का उपचार करने और उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों में स्ट्रोक और दिल के दौरों के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। यह रक्त वाहिकाओं को आराम देता है, जिससे रक्तचाप कम होता है और हृदय को रक्त पंप करने में आसानी होती है। RAMITOP का उपयोग मधुमेह और उच्च रक्तचाप वाले रोगियों में किडनी की रक्षा के लिए भी किया जाता है।

उपयोग और संकेत:

- उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) का उपचार
- हृदय विफलता (हृदय की कमजोरी) के लक्षणों का उपचार
- दिल के दौरों के बाद बचने के लिए जीवन की रक्षा
- मधुमेह और उच्च रक्तचाप वाले मरीजों में किडनी की रक्षा

सामान्य साइड इफेक्ट्स:

- चक्कर आना
- थकान
- सूखा खांसी
- कम रक्तचाप

कम सामान्य साइड इफेक्ट्स:

- सिरदर्द
- मिचली
- चकत्ते
- पोटेशियम का स्तर बढ़ना

खुराक और प्रशासन:

RAMITOP 5MG TAB को अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक के अनुसार लें। उच्च रक्तचाप के लिए सामान्य शुरुआत की खुराक 2.5mg से 5mg प्रति दिन एक बार होती है। आपकी चिकित्सा स्थिति और प्रतिक्रिया के आधार पर खुराक समायोजित की जा सकती है। गोली को पानी के एक गिलास के साथ पूरी तरह से निगलें। खुराक के संबंध में अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है।

चेतावनियाँ और सावधानियाँ:

- RAMITOP का उपयोग किडनी या लिवर की समस्या वाले रोगियों में सावधानी से किया जाना चाहिए।
- यदि आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रही हैं, या स्तनपान करवा रही हैं, तो इस दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें।
- यदि आप रामिप्रिल या किसी अन्य ACE इनहिबिटर के प्रति एलर्जी हैं, तो इस दवा का उपयोग न करें।
- रक्तचाप, किडनी की कार्यक्षमता और इलेक्ट्रोलाइट्स की नियमित जांच की सिफारिश की जाती है।

दवाओं के आपसी प्रभाव:

- RAMITOP कुछ दवाओं के साथ मिलकर प्रतिक्रिया कर सकता है, जैसे कि पोटेशियम सप्लीमेंट्स, मूत्रवर्धक (diuretics), लिथियम और NSAIDs।
- हमेशा अपने डॉक्टर को बताएं कि आप कौन सी अन्य दवाइयाँ ले रहे हैं, जिसमें ओवर-द-काउंटर दवाएं और सप्लीमेंट्स शामिल हैं।

निषेधाज्ञाएँ:

- रामिप्रिल या किसी अन्य ACE इनहिबिटर के प्रति एलर्जी
- गंभीर किडनी रोग
- गर्भावस्था और स्तनपान

क्या करें और क्या न करें:

- **क्या करें:** इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक के अनुसार लें।
- **क्या करें:** अपने डॉक्टर को अपनी सभी चिकित्सा स्थितियों, विशेष रूप से किडनी या लिवर की समस्याओं के बारे में सूचित करें।
- **क्या न करें:** बिना डॉक्टर से परामर्श किए खुराक में बदलाव न करें या दवा लेना बंद न करें।
- **क्या न करें:** बिना डॉक्टर की अनुमति के पोटेशियम सप्लीमेंट्स का सेवन न करें।

RAMITOP लेने से पहले:

RAMITOP लेने से पहले, अपने डॉक्टर को सूचित करें यदि आपके पास किडनी रोग, लिवर रोग है, या आप गर्भवती हैं या स्तनपान करवा रही हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप जो भी दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उनके बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करें।

संपर्क जानकारी:

Econ Healthcare Pvt Ltd

11, प्रथम तल, साइंस सिटी रोड, सोलाह, अहमदाबाद

फोन: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

अस्वीकरण:

यह जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है। हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें और दवा के उपयोग के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें। खुराक में बदलाव करने या RAMITOP को बंद करने से पहले अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से परामर्श करें।

सभी अधिकार सुरक्षित हैं - Econ Healthcare Pvt Ltd